

# 什么是结核病?

结核病 (Tuberculosis, 简称“TB”) 是由**结核杆菌** (*Mycobacterium tuberculosis*) 引起的传染性疾病。结核病分为两种类型。



## 活跃型结核病

活跃型结核病患者  
有可能出现**结核病**的症状也  
可能把结核病**传染**给其他人



## 潜伏型结核病感染

有潜伏型结核病的人  
**不会有症状**, 也不会把  
结核病**传染**给其他人



# 结核病如何传播？

结核病的传播途径**一般**上是透过与活跃型结核病患者**密切和长时间**接触。例如，与患者长时间\* 待在有冷气或通风不良的密闭空间。

\*长时间：累计8个小时或以上



结核病**可**通过以下方式传播...



居住在同一户家



长时间共享密闭空间

结核病**不会**通过以下方式传播...



与其他人握手



分享食物或饮料




触碰床单或马桶座椅



# 结核病有哪些症状 需要留意?



夜间盗汗



持续发烧



持续咳嗽  
至少两周



疲劳



体重减轻



胸口疼痛



痰中带血



# 如果出现**结核病**症状 应该怎么办？



- 1 如有不适，应尽快自我隔离并寻求治疗
- 2 前往医疗诊所或综合诊疗所就医
- 3 告知医生您有结核病症状
- 4 如果怀疑是感染结核病，医生可能会做进一步的检查，并将您转介至国家结核病医疗中心（简称结核病医疗中心）进行评估
- 5 如果确诊为结核病（潜伏型或活跃型），那么您将被安排接受相应的治疗



及时采取行动以保障您和他人的健康



National Centre for  
Infectious Diseases